

IIEF-EF-Fragebogen

Der IIEF-EF-Fragebogen zur Qualität der erektilen Funktion¹

Name

Vorname

Geburtsdatum

Datum der Befragung

Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf mögliche Erektionsstörungen hinsichtlich Ihres Sexuallebens in den letzten sechs Monaten und wurden auf der Basis internationaler Standards erstellt. Lassen Sie bitte keine Frage aus. Jede Frage lässt nur eine Antwort zu.

1. Wie oft waren Sie in der Lage, während sexueller Aktivität eine Erektion zu bekommen?

- Fast nie/nie 1
Gelegentlich (< 50 %) 2
Öfter (ca. 50 %) 3
Meistens (> 50 %) 4
Fast immer/immer 5

2. Wenn Sie bei sexueller Stimulation Erektionen hatten, wie oft waren Ihre Erektionen hart genug, um in Ihre Partnerin einzudringen?

- Fast nie/nie 1
Gelegentlich (< 50 %) 2
Öfter (ca. 50 %) 3
Meistens (> 50 %) 4
Fast immer/immer 5

3. Wenn Sie versuchten, Geschlechtsverkehr zu haben, wie oft waren Sie in der Lage, in Ihre Partnerin einzudringen?

- Fast nie/nie 1
Gelegentlich (< 50 %) 2
Öfter (ca. 50 %) 3
Meistens (> 50 %) 4
Fast immer/immer 5

4. Wie oft waren Sie beim Geschlechtsverkehr in der Lage, Ihre Erektion aufrecht zu erhalten, nachdem Sie in Ihre Partnerin eingedrungen waren?

- Fast nie/nie 1
Gelegentlich (< 50 %) 2
Öfter (ca. 50 %) 3
Meistens (> 50 %) 4
Fast immer/immer 5

5. Wie schwierig war es beim Geschlechtsverkehr, Ihre Erektion bis zum Abschluss des Geschlechtsverkehrs aufrecht zu erhalten?

- Extrem schwierig 1
Sehr schwierig 2
Schwierig 3
Nicht sehr schwierig 4
Kein Problem 5

6. Wie würden Sie Ihre Zuversicht einschätzen, eine Erektion zu bekommen und zu halten?

- Sehr gering 1
Gering 2
Mäßig 3
Stark 4
Sehr stark 5

Auswertung:

Gesamtpunktzahl:	6–10	11–16	17–21	22–25	26–30
Stärke der Beschwerden:	schwere Erektionsstörung	mäßige Erektionsstörung	leichte bis mäßige Erektionsstörung	leichte Erektionsstörung	Keine Erektionsstörung

1 Hinweis:

Bei diesen Fragen handelt es sich um den IIEF-EF-Domain-Fragebogen zur Qualität der erektilen Funktion (EF) auf der Basis des IIEF (International Index of Erectile Function; Rosen RC et al., Urology 1997; 49: 822–830)

Bei einem Ergebnis von weniger als 26 Punkten liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Erektionsstörung vor.